

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

FICHE ACTIVITÉ

Référence : PS 10

U.V. J.S.P. concernée(s) 1 2 3 4

Théorie Pratique Evaluation

U.V. PROMPT SECOURS JSP 2

U.V. – J.S.P. 2

Séquence

↳ Pose d'un collier cervical

Contenu	Pratique	Durée prévisionnelle en Minutes	60
---------	----------	---------------------------------	----


↳ Pose d'un collier cervical : positions allongée, assise, debout,

Matériel

↳ Draps jetables
↳ Jeu de colliers cervicaux

Consignes

↳ Apprentissage de nouvelles techniques qu'ils doivent connaître et maîtriser avant d'aller au SUAP A.




ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Ce qu'ils doivent retenir

POSE D'UN COLLIER CERVICAL :

Q	Il est systématiquement mis en place lorsqu'une lésion du rachis cervical est suspectée (circonstances de l'accident, victime traumatisée inconsciente, etc.) ou évidente (douleur ressentie par la victime)
P	Pour limiter les mouvements de flexion, extension, de torsion ou latéraux de la nuque, le collier diminue le risque d'aggravation d'un traumatisme de la colonne cervicale. Toutefois il n'est suffisant à lui seul pour empêcher tout mouvement de la nuque.
A	2 SP et un jeu de colliers cervicaux.
C	Se reporter aux FT n° 17.2
R	Tout mouvement de la tête de la victime, au cours de la mise en place du collier cervical, doit être proscrit pour éviter toute aggravation d'un traumatisme de la colonne cervicale. Si le collier cervical n'est pas de taille adaptée au cou de la victime, celui-ci peut : <ul style="list-style-type: none">↳ Permettre la flexion si trop petit,↳ Permettre les mouvements de bascule du cou si trop grand,↳ Comprimer la trachée et les vaisseaux sanguins du cou si trop serré. Le collier ne limite pas en totalité les mouvements de rotation et de latéralité de la nuque. C'est pourquoi, il doit toujours être associé à un maintien manuel dans l'attente d'une immobilisation plus efficace.
E	Le collier doit être de taille adaptée. Sa mise en place ne doit pas mobiliser le rachis. Une fois mis en place, l'angle de la mandibule et le sternum en avant, en haut du dos et la base de la tête en arrière, les clavicules et les épaules (près du cou) doivent être en contact avec le collier. Il ne doit en aucun cas gêner la ventilation de la victime.



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Lieu	
------	--

Suivant les conditions climatiques :

- ↳ Salle de cours, Couloirs, Hall,
- ↳ Extérieur,

Remarques	
-----------	--

↳ Pour les techniques se reporter aux FT :

17.2 ↳ Pose d'un collier cervical